

POZITRON - Diagnosztika Kft.		Dokumentum típusa: melléklet
Betegtájékoztató vastagtű biopszia vizsgálatához		Dokumentum száma: me-02 M-07-027 oldal:1/3

## Betegtájékoztató vastagtű biopszia vizsgálatához

**Tisztelt Páciensünk!**

**Diagnosztikus célból Önnél ultrahang/röntgen vezérelt vastagtű biopszia (core biopszia) elvégzése indokolt. A vizsgálat mindenképpen az Ön érdekeit szolgálja, amelyet csak beleegyezése esetén végzünk el. Ez a tájékoztató informálja Önt a beavatkozásról.**

### **Mi a core biopszia?**

A kórosnak gondolt elváltozásból szövettani feldolgozásra történő mintavétel. Az ultrahang/röntgen vezérlés lehetővé teszi a mintavétel helyének pontos meghatározását.

### **Hogyan történik a vizsgálat?**

A beavatkozást ambulánsan végezzük. Nem szükséges éhgyomorra jönnie! A vizsgálandó területet először képkentő eljárással (ultrahang vagy mammográfia) feltérképezzük. A mintavétel során az ultrahang vagy mammográfia kontroll növeli a vizsgálat biztonságát. (A tű helyzete az ultrahang/mammográfia készülék képernyőjén követhető.)

A beavatkozást végző orvos először újra megvizsgálja a kérdéses területet, megtervezi a mintavétel menetét. Helyi izolálás, bőrfertőtlenítést követően helyi érzéstelenítő injekciót kap. Némi várakozás után, éles eszközzel kicsi bőrmetszést ejtünk a bőrén, hogy a mintavételi tű könnyebben behatoljon és a kérdéses helyig vezetjük. Ha a megfelelő pozícióban áll a tű, megkérjük, hogy ne mozogjon, ne ijedjen meg, nagy csattanás következik, amivel a tű kiveszi a mintadarabot. Ezt a nagyobb szövettani pontosság miatt többször megismételjük. Ha már elegendő mintát vettünk, nyomókötetést kap, amit 24 óráig nem szabad levenni és nem szabad, hogy víz érje a sebet.

**Felhívjuk a figyelmét, hogy a helyi érzéstelenítő hatása néhány óra után elmúlik, ezután enyhe fájdalmat érezhet, ha ez fokozódik fájdalomcsillapító tablettát használhat (pl.: Donalgin, Algopirin, Paracetamol származékok), de szalicil tartalmú gyógyszert (Aszpirin, Kalmopyrin) egy napig ne szedjen, mert ezek a véralvadást gátolják.**

Előfordulhat, hogy a mintavétel helye az elkövetkező napokban érzékeny lesz, sőt tapintható csomó és véraláfutás is keletkezhet, de ezek a panaszok fokozatosan enyhülni fognak. A biopsziás mintát formalinban a Patológiai osztályra juttatjuk, ahol a szövettani értékelést elvégzik. Miután megkapjuk a szövettani leletét a Patológiai osztályról, az általunk végzett radiológiai vizsgálatral együttesen értékeljük és végleges írásos véleményt adunk, a folyamat kb. ... napot vesz igénybe. Az eredményt előzetes egyeztetés után Intézetünkben veheti át.

### **Milyen komplikációk léphetnek fel?**

- Allergiás reakció az érzéstelenítőre
- Vérzés és enyhe fájdalom a szúrás helyén, amelyek általában kezelést nem igényelnek.
- Erősebb, esetleges műtéti beavatkozást is igénylő vérzések extrém ritkák.
- Nagyon ritkán a szúrás helyén sebgyógyulási zavar (elfertőződés, keloid képződés) léphet fel.
- Néhány esetben keringési zavar, ájulás fordulhat elő.
- Ritka esetben előfordulhat mellhártyásérülés, mellúri levegőgyülem (pneumothorax, ptx) képződéssel.
- A tudomány jelenlegi állása szerint a beavatkozás nem jelent tumorszóródási veszélyt!

POZITRON - Diagnosztika Kft.		Dokumentum típusa: melléklet
Betegtájékoztató vastagtű biopszia vizsgálatához		Dokumentum száma: me-02 M-07-027 oldal:2/3

### Figyelem!

**A szúrt sebre tett kötést, vagy tapaszt idő előtt ne vegye le (kövesse az orvos utasításait) és 24 óráig kerülje a sebrület tisztítását!**

**Utánvérzés vagy egyéb komplikáció esetén azonnal forduljon orvoshoz! Ha nagyfokú duzzadást, fájdalmat, vérzést tapasztal, forduljon a beküldő orvosához, esetleg ügyelethez.**

A vizsgálat eredménye ... nap alatt készül el. **Kérjük, feltétlenül érdeklődjön Intézetünkben az eredmény után, mivel az esetleg szükséges további beavatkozások is az Ön érdekét szolgálják!**

**Kérjük, korábbi orvosi dokumentációit a vizsgálatra hozza magával!**

A komplikációmentes vizsgálat és a rizikó tényezők kiszűrése érdekében **kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket!**

Szenved Ön véralvadási zavarban?

O nem            O igen.....

Szed Ön véralvadásra ható gyógyszert (Syncumar, Ticlid, Aspirin, Astrix stb.)?

O nem            O igen.....

Van-e Önnek ismert Lidocain érzékenysége?

O nem            O igen.....

Szenved Ön sebgyógyulási zavarban (fokozott hegképződés, keloid)?

O nem            O igen.....

Hajlamos az ájulásra, vagy szenved Ön nagy vérnyomás ingadozástól?

O nem            O igen.....

Cukorbeteg?

O nem            O igen.....

Van Önnek Hepatitis, vagy HIV fertőzése?

O nem            O igen.....

Terhesség kizárható?

O nem            O igen.....

<b>POZITRON - Diagnosztika Kft.</b>		<b>Dokumentum típusa: melléklet</b>
<b>Betegtájékoztató vastagtű biopszia vizsgálatához</b>		<b>Dokumentum száma: me-02 M-07-027</b> <b>oldal:3/3</b>

Ezúton tanúsítom, hogy a tájékoztatót elolvastam, megértettem és a feltett kérdésekre legjobb tudomásom szerint válaszoltam. **Beleegyezem a javasolt beavatkozás elvégzésébe.** A vizsgálatot végző orvossal folytatott személyes megbeszélés során, a beavatkozással kapcsolatos kérdéseimre teljes körű és kimerítő választ kaptam.

.....

Páciens (vagy törvényes képviselő) aláírása

Orvos neve, aláírása

Dátum:.....

Orvosi megjegyzések a betegtájékoztatásról:

.....  
.....

A páciens a vizsgálatba beleegyezik

O nem      O igen

Amennyiben nem, úgy a páciens az ebből adódó hátrányokról tájékoztattam:

.....  
.....  
.....

Ezúton tanúsítom, hogy a tájékoztatót elolvastam, megértettem és a feltett kérdésekre legjobb tudomásom szerint válaszoltam. **Nem egyezem bele a javasolt beavatkozás elvégzésébe.** A vizsgálatot végző orvossal folytatott személyes megbeszélés során, a beavatkozás elmaradásából adódó tájékoztatást megkaptam, az ebből adódó hátrányokkal kapcsolatos kérdéseimre teljes körű és kimerítő választ kaptam.

.....  
páciens (vagy törvényes képviselő) aláírása

.....  
orvos neve, aláírása

.....  
dátum