

<b>Pozitron - Diagnosztika Kft.</b>	Dokumentum típusa: melléklet (me)
<b>Tájékoztató visszer sclerotizáláshoz (injekciós kezelés)</b>	Dokumentum száma: me-19-M-11-001 Hatályba lép:2024.05.13. Oldalszám: 1/1

### **Tájékoztató visszer sclerotizáláshoz (injekciós kezelés)**

#### **Általános tudnivalók:**

A scleroterápia során beadott kémiai anyag az érben enyhe, steril gyulladást okoz, ezzel az érfal hegesedését indítja el, ami a véna falait egymáshoz tapasztja, így az adott érszakaszt kizárja a keringésből. Ezt követően a kezelt érszakasz felszívódik.

#### **Beavatkozás előtti teendők:**

Kérjük a beavatkozásra kényelmes, nem szoros ruházatban érkezzen. Sportcipő vagy papucs viselése javasolt.

Felhívjuk figyelmét, ha Ön rendszeresen vérhígítót szed, azt beavatkozás előtt jelezze a szakorvosnak!

#### **Beavatkozás menete:**

Az érsebész a tágult visszeret kis tűvel megsúrja, és a sclerotizáló anyagot a tűn keresztül a vénába juttatja. A kezelés végén a lábra kompressziós harisnyát vagy fáslit helyezünk, amely a vénafalakat (48 órán át folyamatosan) összetapasztva tartja. A kezeléseket több szakaszban történnek. Egy alkalommal 2 ml hatóanyag (kivételes esetben maximum 3 ml) adható be a páciensnek. Erről az érsebész az injekciózás alkalmával dönt

#### **Beavatkozás utáni teendők:**

A scleroterápia után legalább 20 perc séta javasolt, a passzív álló vagy ülő testhelyzetet kerülni kell. Ha a kezelt terület érzékeny, meleggé válna, hűtése javasolt (pl gyógyszerértárban kapható hűtőzsével).

#### **Borogatás szigorúan tilos!**

A scleroterápiát követően minimum négy hétig kerülni kell a forró fürdőt, a szaunát, a napozást és a szolárium használatát.

A kezelést követően új erek jelenhetnek meg. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a kezelt erek "nőnek ki" újból, hanem azt, hogy más helyeken tágulnak ki az erek. Ez a jelenség elsősorban akkor fordulhat elő, ha a páciens nem tartja be a kezelőorvos utasításait, különös tekintettel a harisnya viselésére. Harisnya-kompresszió alkalmazásával a mélyebb erek felé áramlik a vér, kompresszió nélkül azonban a vér a kezelt területhez közeli ereket fogja azonnal kitágítani. Utóbbi esetben a scleroterápia ismételhető.

Ahhoz, hogy a további seprűvénák kiújulásának esélye kisebb legyen, tartózkodni kell az elhízástól, a szaunától, a forró fürdőtől és az erős napsugárzástól, illetve javasolt kényelmes cipőt hordani és vénás keringést fokozó sportot üzni.

#### **Lehetséges szövődmények:**

Bár a scleroterápia során kevés esetben fordul elő komplikáció, szövődmény, fontos tudni, hogy mint minden beavatkozás, a scleroterápia is kockázattal járhat.

A kezelést követően a túsűrások helyén kis bevérzések, kék foltok jelenhetnek meg, melyek 1-2 hét alatt nyomtalanul felszívódnak. Amennyiben a kompresszió elmozdul, a visszaáramló vér is "belekötődhet" az érbe, amely barnás-kékessé válik, de pár nap alatt ez is felszívódik.

A scleroterápiával kezelt területen kialakulhat bőrpír, égő érzés, ill. fájdalom is megjelenhet. Ezek enyhe hűtés, jegelés (**borogatás tilos!**) hatására általában megszűnnek.

Néhány esetben a beadott anyagra való érzékenység tartós barnás elszíneződést okozhat, ami általában 6-12 hónapon belül spontán felszívódik, csak kivételes esetekben lehet maradandó.

A scleroterápiával kezelt felületen a bőrfelszínhez közel kerülő sclerotizáló anyag miatt kis hámszűrés alakulhat ki, mely később porckel spontán gyógyul.

*Önt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Tv. 13§-a alapján megilleti a tájékoztatáshoz való jog, a 15. §-a alapján az önrendelkezési jog, valamint a 24. § szerint az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. Mindezek alapján a vizsgálati eredmények közléséről a beleegyező nyilatkozatban kell döntenie.*

Amennyiben további kérdése van, kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

#### **Pozitron Medical Diagnosztika Központ**

1117 Budapest, Hunyadi János út 9-11. Tel: +36-1-505-8888 E-mail:[info@pet.hu](mailto:info@pet.hu)